

Actlet® C

Cultivo	Enfermedad	Dosis (l/ha)	Volumen de caldo	Nº tratamientos	Intervalo de aplicaciones	Estado del cultivo	Plazo Seguridad
Patata	<i>Phytophthora infestans</i>	3,5 L/ha	500-1000 L/ha	3	7-10 días	BBCH 36-81	21 días
Tomate y Berenjena (aire libre e invernadero)	<i>Phytophthora infestans</i>	3,5 L/ha	500-1000 L/ha	3	7-10 días	BBCH 29-81	10 días en aire libre 3 días en invernadero

EDICIÓN: Mayo 2019



NUEVO
2019



Actlet® C

Fungicida



DIFFERENTIATION
LEADING TRENDS
COMPETITIVE ADVANTAGE
ADAPTED SOLUTIONS
INDEPENDENCE
ECONOMIC DRIVING FORCE
INNOVATION
ADD VALUE
INTERNATIONAL PRESENCE



IT MEANS
Competitiveness, quality and innovation by Sapec Agro Business




www.ascenza.es

ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA, S.A.U. Parque Empresarial TÁCTICA C/ Botiguers, nº 3 - 4ª Planta. 46980 - Paterna (Valencia) Telf. 96 134 51 50 / Fax. 96 134 35 10



TODA LA EFICACIA DEL METALAXIL-M PARA EL CONTROL DE MILDIU

ACTLET® C combina la acción del Metalaxil-M y del Hidróxido de Cobre, convirtiéndose en una solución única con actividad preventiva, curativa y antiesporulante para el control de **mildiu** en **patata**, **berenjena** y **tomate**.



www.ascenza.es

ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA. USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
La información del folleto no exime de seguir las indicaciones de la etiqueta del producto.



Actlet® C es un fungicida con una formulación única a base de Metalaxil-M e Hidróxido de Cobre muy eficaz para el control de *Phytophthora infestans* en cultivos de **patata, tomate y berenjena**.

La eficacia de **Actlet® C** se basa en la combinación de la acción sistémica del Metalaxil-M con la acción de contacto del Hidróxido de Cobre.


COMPOSICIÓN: Metalaxil-M 28,5 g/L + Hidróxido de Cobre 215 g/L

FORMULACIÓN: Suspensión concentrada (SC)

ACCIÓN COMPLETA DURANTE TODO EL CICLO DEL HONGO

Actúa en todas las fases del ciclo de vida del Mildiu mediante acción:


- 1 - **Preventiva:** evita la germinación de esporas y la formación del micelio
- 2 - **Curativo:** evita el desarrollo del micelio
- 3 - **Antiesporulante:** Impide la formación de nuevas esporas



Actlet® C

MOMENTOS DE APLICACIÓN


APLICACIÓN EN PATATA



ACTLET® C: Aplicar desde BBCH 36 hasta BBCH 81



APLICACIÓN EN TOMATE Y BEREJENA



ACTLET® C: Aplicar desde BBCH 29 hasta BBCH 81



VENTAJAS

- **Protección de los nuevos crecimientos** gracias a su **sistemia acrópeta**
- **Rápida absorción** tras su aplicación foliar.
- **Protección duradera en el tiempo**
- **Alta resistencia al lavado**
- La **formulación líquida:** mejor solubilidad y cobertura.
- Autorización tanto en **invernadero** como al **aire libre**.
- Amplia ventana de aplicación
- Adecuado para incluir en un **programa de gestión de resistencias**. Metalaxil-M está clasificada dentro del al grupo A1 del Comité de Acción sobre la Resistencia a Fungicida (FRAC) y el Cobre está clasificada dentro del grupo M1 .

ASCENZA®