

Si no puedes ver bien esta newsletter haz click [aquí](#)

El reenvío de este correo tiene problemas de visualización y de pérdida de información.

Si quieres reenviar o imprimir este boletín te lo puedes descargar en pdf pulsando [aquí](#)

SÍGUENOS

CÍTRICOS 01/18

**E.F.: Reposo invernal, después de recolección a
Comienzan a hincharse las yemas**



HONGOS VARIOS

Como sabéis durante la recolección se producen numerosas pequeñas heridas al árbol. Una aplicación con fungicidas de contacto tras la recolección ayuda a cerrar heridas sin riesgo de enfermedades futuras. Además, se reduce el inóculo de esporas de varios hongos (**Phoma, Alternaria, Amycospharella, Antracnosis,...**) y bacterias de cara a la siguiente campaña. Si escogemos un fungicida cúprico, nos ayudará a retrasar el inicio de la brotación para así intentar escapar del riesgo de heladas. El Cobre también tiene acción molusquicida frente a caracoles; si efectuamos la aplicación en condiciones de alta humedad ambiental, con los caracoles activos, conseguiremos reducir su nivel poblacional.

Hidrocuper 50

Dosis: 150 gr/hL

No mezclar con Aminoácidos, Algas ni Fosetyl-Al

GRUPO Multi sitio FUNGICIDA

MANTENIMIENTO DEL SUELO

La época invernal, después de la recolección y antes de la nueva brotación, resulta muy propicia para las **aplicaciones herbicidas**, pues ya no existe el riesgo de mojar la fruta y las hojas adultas, en caso de llegar a mojarse, son las más resistentes.

En el mismo tratamiento podemos eliminar las malas hierbas otoño-invernales

(HERCAMPO GREEN) y **evitar la nascencia de la flora** de hoja ancha de primavera (MOHICAN 50 SC, REGISTER 25 WG).

Mohican[®] 50 SC

Dosis: 500 – 700 cc/ha según persistencia deseada
Caldo: 200 – 600 L/ha según humedad del suelo
No mojar las partes verdes del cultivo

GRUPO **F₁** HERBICIDA

Hercamp[®] Green

Dosis: 3-6 L/ha malas hierbas anuales, según desarrollo de las mismas
6-10 L/ha malas hierbas vivaces
Caldo: 200 – 300 L/ha
No mojar las partes verdes del cultivo

GRUPO **G** HERBICIDA

Register[®] 25 WG

Herbicida sistémico con acción postemergente y residual.
Dosis autorizada: 60 – 200 g por **hectárea realmente tratada**.
Una única aplicación por año, en primavera.
Aplicar en bandas, sin superar la dosis de 67 g por hectárea de cultivo



GRUPO **B** HERBICIDA



Conyza sp.

> Para controlar malas hierbas ya nacidas requiere que estén en crecimiento activo.

En postemergencia, en general son suficientes dosis de 60-80 g/ha, **siempre junto a Hercampo Green**. La dosis de Hercampo fluctuará dependiendo del tipo y tamaño de las malas hierbas como es habitual.



Lolium sp.

> Para proporcionar una buena persistencia debe ser aplicado con humedad en el terreno o con una ligera lluvia en los siguientes días tras la aplicación para así fijarlo al suelo.

Las dosis en preemergencia variarán entre 100-200 g/ha según la persistencia deseada.

Register a 100 g/ha junto a Hercampo Green controla cualquier especie de *Conyza sp.* (Pinito, Pinet) en estado de roseta en crecimiento activo (ver foto) y además impide posteriores nascencias de éstas.

También controla *Lolium sp.* (vallico) hasta el estado de ahijado (ver foto).

Así mismo, controla otras malas hierbas presentes y evita futuras nascencias tanto de malas hierbas de hoja ancha como estrecha.

MANTENIMIENTO DEL SUELO "VIVO"

Cada día se hace más patente la importancia de mantener el suelo "vivo", es decir, con una adecuada y equilibrada actividad microbiológica que permita a los cultivos desarrollar su máximo potencial.

En este sentido, el aporte de materia orgánica compostada con un alto nivel de carga microbiana se hace indispensable mantener un grado de fertilidad óptimo. Así mismo, un adecuado contenido de materia orgánica en el suelo nos ayudará a mejorar la asimilación de nutrientes en el arranque primaveral, así como a mejorar las propiedades físico-químicas del suelo.



ORGANIC **ORGANIC**
ECO SAPEC

Dosis: 2.000-2.500 kg/ha

MEJORA DE LA EFICACIA DEL GLIFOSATO

La mejora de la eficacia de los tratamientos herbicidas es de vital importancia a la hora de conseguir los máximos resultados con la mínima inversión. En este sentido la adición de un mejorador del caldo de tratamiento es la mejor opción.



Tensioactivo para mejorar la adhesión de los herbicidas a las malas hierbas.

Acidificante del caldo de aplicación.

Cuenta con un virador de color del caldo que permite valorar con mayor exactitud el pH alcanzado.

Dosis: 50-100 cc/hL, dependiendo de la dureza y pH inicial del agua utilizada, así como del pH óptimo de aplicación que deseemos.



Suporter plus en una formulación de nueva generación diseñada para aumentar la persistencia y adhesión del tratamiento mejorando además sus propiedades emulsionantes y antideriva.

Las necesidades y problemáticas de los cultivos pueden variar en función de las condiciones climáticas, edáficas, varietales, etc. Si quieres una recomendación más detallada o ajustada a tus condiciones de cultivo puedes contactar con el responsable técnico de Sapec en tu zona.

FITOSANITARIOS

Juan A. Baviera
650470089
jbaviera@sapac-agro.es

NUTRICIONALES

Centro-Norte
Xavier Monfort
696936821
xmonfort@sapac-agro.es

NUTRICIONALES

Sureste
Andrés Pérez
671 988 400
arperez@sapac-agro.es

NUTRICIONALES

Suroeste
Luís Gironza
609 55 91 02
lgironza@sapac-agro.es

Puedes contactar con mediante el siguiente teléfono: o la siguiente dirección:



Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: [Baja](#)

Copyright © 2016 Sapec Agro España, All rights reserved. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos identificativos y los contenidos en los correos electrónicos se incorporarán a un fichero de Gestión responsabilidad de SAPEC AGRO, S.A.U. con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose ante SAPEC AGRO, S.A.U. – Responsable Protección Datos - Parque Empresarial Táctica - Edificio Onofre, C/ Botiguers, nº 3 - 4ª Planta, 46980 - Paterna (Valencia), adjuntando para su identificación una copia de su DNI. Este mensaje y cualquier documento que lleve adjunto, en su caso, es confidencial y destinado únicamente a la persona o entidad a quien ha sido enviado.